

本
草
從
新

本草從新卷二目錄

草部 芳草類三十四種

當歸

芍藥

芎藭

牡丹皮

澤蘭

馬蘭

鬱金

薑黃

蓬莪朮

荆三稜

香附

木香

砂仁

白豆蔻

草豆蔻

草果

肉豆蔻

破故紙

益智子

蛇牀子

華菱

良薑

藿香

白芷

藁本

香薷

荊芥

紫蘇

雞蘇

薄荷

甘松香

山柰

嫺耐草

茉莉花

本草從新卷二

草部 芳草類

歸 補血潤燥滑腸

甘溫和血辛溫散內寒苦溫助心散寒諸血屬心凡通脈者必先補心當歸若溫

助入心肝脾心生血肝藏血脾統血為血中氣藥治虛勞寒熱欬逆上

氣血和則氣降溫瘧厥陰肝邪痢頭痛腰痛心腹肢節諸痛散寒和血跌

打血凝作脹風瘕無汗身強項直角弓反張日瘕無汗為剛

產後亦有發瘕者以脫血無有汁為柔瘕當歸辛散風溫和血痿痺癥瘕筋骨緩縱足不任地

肉血脈以養筋也宜十全大補湯瘕證癰疽瘡瘍衝脈為病氣逆裏急帶脈為病腹痛

日瘕滿腰溶溶如坐水中衝脈起於腎下出於氣街夾臍上行至

修三陰灌諸路爲十二經脈之海主及婦人諸不足一切血

證陰虛而陽無所附者潤腸胃澤皮膚去瘀生新溫中養營

活血舒筋排膿止痛血利則使氣血各有所歸故名血滯能

能補血枯能潤血風能撫蓋其辛溫能行氣分使氣調而血

和也東垣曰頭止血而上行身養血而中守尾破血而下流

全活血而統治雷教海藏並云頭破血時珍曰治上用頭治

中用身治下用尾統治全用○雷教著雷公炮炙論時珍曰

此雷公是劉宋時雷極善消腸瀉者禁用當歸爲君白芍

教非黃帝時雷公也芎藭爲使名四物湯治血之總劑血虛佐以人參黃芪血熱

佐以條芩梔連切菴日血屬陰須得陽氣而生四物純陰不

能生血氣虛血弱之人當川產力剛磨攻秦產力柔善補

用參芪取陽旺生陰之義以秦產頭圓尾多肥潤氣香裏白不油者爲良名馬尾當歸

尾粗堅枯者名饒頭當歸只宜發散用宜酒製治吐血宜醋

炒畏薑瀉海藻生薑惡淫麴當歸和酒服治倒產子死不出

白芍藥補血瀉肝斂陰

苦酸微寒入肝脾血分白朮補脾陽為手足太陰行經藥肺

瀉肝火為酸斂肝肝以斂安脾肺固腠理肺主皮毛脾主肌肉

土旺能生金則脾安和肺安則脾理固矣和血脈收陰氣斂逆氣酸主收斂緩中止

痛車垣曰損其肝者除煩放汗退熱安胎治瀉痢後重血虛

腹痛疴痢俱太陰病先可缺此寒瀉冷痛忌用古方治腹痛

從逆於內裏白芍能調營氣甘草能緩逆氣又痛為肝木克

脾土白芍能伐肝故也其治腹痛止血虛腹痛餘痛不治以

溫散之功也脇痛胃脘痛橫行則兩脇痛白芍能斂氣瀉

火肺脹喘噎愛脾熱易飢其收降之性又能入血海衝脈為

女皆有之而至厥陰肝經治鼻衄目瀉肝血不足小兒痘瘡地紅血

附瘡必用婦人胎產及一切血病同白朮補脾同參芪補氣

同甘草止腹痛同芎藭止瀉痢同防風發痘疹同藳朮和又

營衛酒炒加入補中益氣湯中治氣虛下陷尤稱神妙

曰產後忌用丹溪曰以其後寒或生之氣也必不得已酒

也寇宗奭本草衍義曰減芍藥以避中寒微寒如芍藥古人

猶諄諄戒謹况大苦大寒可肆行而莫之忌耶按產後虛熱

多汗氣失散用白芍以收斂者取微寒以退虛熱正其

相宜前言亦失之太過耳景岳全書內所論極為中正

赤芍藥瀉肝散瘀瀉肝火散惡血利小腸治腹痛脇痛堅

積血癰疽瘰癧邪聚外腎為經閉腸風癰腫目赤皆散瀉白補

而飲赤散而瀉白益脾能於土中瀉木赤散邪能行血中之

滯虛者忌用赤白各隨花色單瓣者入藥酒炒用制其婦

人血分醋炒下痢後重不炒惡芒硝石斛畏鼈甲小蘗反藜

膚

補血去瘀潤燥宣行氣搜風

辛溫升浮為少陽引經 入手足厥陰 乃血中氣藥升

清陽而開諸鬱 丹溪曰氣升則鬱目降 潤肝燥而補肝虛以

瀉為補所謂辛以 上行頭目下行血海 脈搜風散瘀止痛調

經治風溼在頭諸種頭痛 東垣曰頭痛必用之如不愈加引

胡太陰蒼朮少陰細辛厥陰吳茱 黃丹溪曰諸經氣鬱亦能頭痛 偏正頭風腹痛脇風氣鬱

血鬱血痢寒痺筋攣目淚多涕 熱風木為病 諸風眩暈及癰

疽瘡瘍 癰從六腑生疽從五臟生皆陰陽相滯而成氣為陽

本草從新 芍藥 牡丹皮 三 草部

凝滯而行遲為不及火熱搏之則沸騰而行速為太過氣鬱邪入血中為陰滯於陽血鬱邪入氣中為陽滯於陰致生惡毒百病皆由此起芎歸痘瘡不起頭而土不起發男婦一切能和血行氣而通陰陽

血證行血藥之滯耳川芎辛散豈能生血者乎治法云婦人經過三月用川芎末空心熱湯調一匙服腹中微動者是胎不動是經閉凡氣升痰喘虛火上炎嘔吐欬逆不宜用之單服久服令人暴亡蜀產為川芎

素產為西芎江南為撫芎以川產大塊裏白不油辛甘者良白芷為使畏黃連硝石滑石惡黃芪山茱萸齒敗口臭木煮芎藭合之佳

牡丹皮瀉伏火去瘀

辛甘微寒入手足少陰心厥陰心包瀉血中伏火色赤故入血分能瀉

諸經伏火古方惟以此治相火也世人專以黃藥治相火不知丹皮之功更勝和血涼血而生血熱血

則枯涼 破積血之火不注則通經脈止吐衄血屬陰本靜因相火所逼故越

則生 治驚癇癎瘕筋脈伸縮抽掣為癎瘕或手足抽掣一

皆陰虛血熱風火相 除煩熱療癰瘡涼下胞胎退無汗之骨

張元素曰丹皮治無汗之骨蒸地骨皮治有汗之骨蒸神

神志不足也按內經云水之精為志 胃氣虛寒經行過期

不淨者勿服胎前亦宜酌用 單辦花紅者時珍曰花

者利須 肉厚者佳酒拌蒸用畏貝母菟絲大黃忌蒜胡荽伏

砂 丹皮根搗末 服解中蠱毒

澤蘭 通行血消水

苦泄熱甘和血辛散鬱香舒脾微溫行血入足太陰厥陰

通九竅利關節破宿血通月經消癥瘕散水腫

甘溫能和血行血獨入血

海攻擊稽留其消水腫者乃血化為水之木非脾虛停滯之水也

治產後血瘀腰痛未盡身

面浮腫吐血鼻洪目痛頭風癰毒撲損

性雖和緩終是破

血之品無瘀者勿輕用

古方澤蘭九甚多近今稟賦漸薄不可常用

時珍曰蘭

草澤蘭一類二種俱生下溼紫莖素枝赤節綠葉葉對節生

有細齒但以莖圓節長葉尤有歧為蘭草莖微方節短葉有

毛為澤蘭嫩時並可採

音

而佩之楚詞所謂紉秋蘭以為佩

也

朱子離騷辨證云必花葉俱香燥澤不變方可刈佩今之蘭蕙花雖香而葉無氣質易萎不可刈佩

澤蘭

走血分消水腫塗癰毒破瘀除癥為婦人聖藥蘭草走氣分

利水道除痰癖殺蠱辟惡為消渴良藥

經曰數食肥甘傳為消渴治之以蘭除陳

氣亦名大澤蘭與澤蘭俱生下俗呼省頭草
夏月采置髮中則髮不感風

澤草香草

浸油塗髮去垢香澤改名蘭澤又名香草

以為山蘭誤矣

寇宗奭朱丹溪並以蘭草

為山蘭之葉李時珍考眾說以議之曰陸遊齊閑覽云楚騷

之蘭或以為都梁香或以為澤蘭或以為狗蘭當以澤蘭為

正今之所種如麥門冬者名幽蘭非真蘭也故陳止齋著益

蘭說以議之方虛谷計蘭說言古之蘭草即今之千金草俗

名孩兒菊今所謂蘭其葉如茅者根名土續斷曰花馥郁故

得蘭名揚升菴云世以如蒲莖者為蘭九畹之受誣也久矣

又吳與澄草廬集有蘭說云蘭為醫經上品有枝有莖草之

植者也今所謂蘭無枝無莖因黃山谷稱之世遂謬指為離

騷之蘭冠氏本草溺於流俗反疑舊說為非夫醫經為實用

豈可誣哉今之蘭果可以利水殺蠱而除痰癖乎其種盛於

閩朱子聞人豈不識其上產而辨析若此世俗至今猶以非

蘭為蘭何其惑之甚也洛坡時珍之辨蘭草指實詳明微據

莖葉則蘭草為澤蘭之一類二種也夫復何疑若山蘭葉之

無氣未於以上之稱名不符何能有以上之功效乎汪氏

辨蘭草為山蘭葉但並無實據不過為臆度之見爾。士材

所著本草監收蘭葉致無識之醫遂有知建蘭葉為蘭草

馬蘭 瀉涼血

辛涼入陽明血分與澤蘭同功治鼻衄痔瘡喉痹口緊馬蘭根葉搗汁入米

醋少許滴鼻孔或
灌喉中取痰自開

鬱金 宣解鬱滯涼血破瘀

辛苦微甘氣寒其性輕揚上行入心及包絡兼入肺經涼心

熱散肝鬱破血下氣治吐衄尿血婦人經脈逆行經不下行上為吐血

諸聖用鬱金末加韭汁薑汁童便服其血巨清痰中帶血者如竹瀝血氣諸痛產後敗血攻心

顛狂失心顛多喜笑尙知畏懼證屬不足狂多忿怒人莫能制證屬有餘因驚憂痰血塞於心竅所致用鬱金

七兩白礬三兩薄荷糊丸名白豆毒入心因瘀血疑滯而痘疹陷伏者可用

陽壽生肌定痛 能開肺金之鬱故名 今醫用此開鬱

效如真陰虛火亢吐血不關肺肝氣逆不宜用也近日鬱證多屬血滯

用破血之藥開鬱不能開而陰已先敗致不救者多矣 出川廣體銳圓如蟬肚外黃

內赤色鮮微香折之光明脆微苦中帶甘者乃真今市中所用者多是

蘆黃並有以蓬莖莖偽之者俱峻削性烈挾虛者大忌

蘆黃 瀉破血行氣

味苦辛溫色黃入脾兼入肝經理血中之氣破血下氣辛散苦泄

專於破血下氣 除風消腫性更烈於鬱金治血積氣脹產後其旁及者耳

敗血攻心通月經療撲損片子者能入手臂治風寒溼痺痛

時珍曰入臂治痛其藥 血虛者服之病反增劇 出川廣

聖血中之氣可知矣 藏器曰鬱金苦寒色赤蘆黃辛溫色黃迥味苦色青三物不同所用各別經疏云蘆黃主心介十三段鬱金之間時珍曰

本草從新 蘆黃 蓬莖莖 本草 部

藤黃鬱金莪朮形狀功用大略相近但鬱金入心專治血腫黃入脾兼治血中之氣莪入肝治氣中之血稍為不同今時以扁如乾薑者為片子莪黃圓如蟬腹者為蟬

莪朮莪朮形似鬱金而色青不赤為異耳

莪朮莪朮行氣破血消積

辛苦而溫主一切氣又能通肝經聚血行氣消瘀通經化食

止痛治心腹諸痛冷氣吐酸奔豚疝瘕

酒醋磨服疝音賢小

子癰最多見於婦人莪朮香烈行氣通竅同三棱用治積聚諸病按五積心積曰伏梁起臍上至心下肝積曰肥氣在左脇肺積曰息贖在右脇脾積曰痞氣在胃脘右側腎積曰奔豚在小腹上衝至心下治之不宜專用攻伐恐損真氣宜於破血行氣藥中加補脾胃藥氣旺方能磨積也經曰大積大聚其可犯也衰其半而止過者死東垣五積方用三棱莪朮皆兼人參中惡鬼疰

臟腑壅滯陰陽乖隔鬼疰憑

虛人服

之積未去而真已竭兼以參朮或庶幾耳根如生薑莪生

根下似卵不齊堅硬難搗灰火煨透乘熱搗之入氣分或醋磨

酒磨或煮熟用入血分

荆三稜薄破血行氣消積

苦平入肝經血分破血中之氣亦能通肝經聚血散一切血瘀氣結

瘡硬食停老塊堅積消腫止痛通乳墮胎功近香附而力峻

按化積必藉氣運專用伐尅氣愈不運積安得去須輔以

健脾補氣為要 色黃體重若鯽魚而小者良醋浸炒或麴

裏煨三稜兩半丁香三分為末沸湯服一錢治反胃藥食不下

香附名莎草根 宜調氣解鬱

氣香味辛能散微苦能降微甘能和乃血中氣藥通行十二

經八脈氣分主一切氣

人身以氣為主氣盛則強虛則弱順則平逆則病絕則死矣經曰怒則氣

上怒則氣下喜則氣緩悲則氣消驚則氣亂思則氣結勞則氣耗又曰寒則氣收熱則氣泄名九氣以香附為君隨證而

加升降治

利三焦解六鬱

痰鬱火鬱氣鬱血鬱滯鬱食鬱

治多怒多憂痰飲

積聚痞滿腹脹霍亂吐瀉癰疽瘡瘍

血氣滯所致香附未服名獨勝凡治癰疽疔

鬱怒而得者如瘡初作以此代茶大凡瘡疽喜服香藥行氣通血最易真識不潔獨之康祖左乳病隨又隨開生核痛楚

牛載請張王夢授以方蘆汁製香附為末每服二錢米飲下遂愈

吐血便血崩中帶下月候

不調氣為血配血因氣行成塊者氣之凝將行而痛氣之滯行後作痛氣血俱虛也色淡亦虛也色紫氣之熱也色黑

則熱之甚也錯經者氣之亂肥人痰多而經阻氣不運也香附除中快氣之乘氣順則血和暢然須輔以涼血補氣之藥

丹溪曰能引血藥至氣分而生血宜與補氣血藥同用

諸種氣痛胎產百病

時珍曰得參此則補

氣得歸地則補血得木香則散滯和中得檀香則理氣醒脾得沉香則升降諸氣得芎藭蒼朮則總解諸鬱得梔子黃連

則清降火熱得茯神則交濟心腎得尚香破故紙則引氣歸元得厚朴半夏則決壅消脹得紫蘇蔥白則發汗散邪得三棱莪朮則消積磨塊得艾葉則治血氣暖子宮乃氣病之總司女科之仙藥也大抵婦人多鬱氣行則鬱解故服之尤效非宜於婦人不宜於男子也又曰凡人病則氣滯而致苦香附為氣分君藥臣以參芪佐以甘草治氣滯甚速也

燥而能耗血散氣

土材曰乃治標之品唯氣實血未大虛者宜之不然恐損氣而耗血愈致其疾矣世

俗泥於女科仙藥之一語惜未有發明及此者

產金華者良生則上行胸膈外達

皮膚熟則下走肝腎旁徹腰膝童便浸炒鹽水浸炒則入血

分青鹽炒則入腎酒浸炒則行經絡醋浸炒則消積聚且斂

其散蜜水炒制其燥性鹽汁炒則化痰飲炒黑又能止血忌

鐵

治時耳出汁香附為末以絲杖送入

木香

宣行氣

辛苦而溫三焦氣分之藥能升降諸氣泄肺氣疏肝氣和脾

氣心則肝氣上肺氣調則金能制木而肝平木不尅土而脾和治一切氣痛時珍曰諸氣

肺上焦氣滯用之者金鬱泄之也中氣不運皆屬於脾中焦

氣滯用之者脾胃喜芳香也大腸氣滯則後重勝胱氣不化

則癰閉肝氣鬱則為痛下焦中氣不省閉目不語如中風狀

氣滯用之者塞者通之也中氣不省為未冬瓜子煎湯灌

下三耳卒聾閉切一兩酒浸一夜入嘔逆反胃霍亂瀉痢後

錢同前耳卒聾閉麻油一合煎湯滴耳嘔逆反胃霍亂瀉痢後

重同前耳卒聾閉麻油一合煎湯滴耳嘔逆反胃霍亂瀉痢後

重同前耳卒聾閉麻油一合煎湯滴耳嘔逆反胃霍亂瀉痢後

重同前耳卒聾閉麻油一合煎湯滴耳嘔逆反胃霍亂瀉痢後

毒衝脈為病氣逆裏急殺鬼物禦瘴霧去腋臭健胃寬中醒

脾消食開鬱安胎氣逆則胎不安香燥而偏於陽肺虛而熱血枯

而燥者慎勿與之丹溪曰味辛氣升若陰火衝上者反助

番舶上來形如枯骨味苦黏舌者良名青木香今人皆稱為

番舶上來形如枯骨味苦黏舌者良名青木香今人皆稱為

番舶上來形如枯骨味苦黏舌者良名青木香今人皆稱為

番舶上來形如枯骨味苦黏舌者良名青木香今人皆稱為

番舶上來形如枯骨味苦黏舌者良名青木香今人皆稱為

香磨汁用東垣用黃連製亦有蒸用麪裹煨用者煨用實具

火本香內有番曰芷狀同但色微黑體

砂仁即縮砂菴。宜行氣調中

辛溫香竄和胃醒脾快氣調中通行結滯治腹痛痞脹痞滿

寒下早裏虛邪入而痞者有食壅痰塞而痞者有脾虛氣弱

而痞者須分虛實治之不宜顛用利氣藥恐變為鼓脹鼓脹

內脹而外有形痞虛唯覺痞悶而已皆太陰為病也霍亂轉筋噎膈嘔吐上氣欬嗽奔

豚崩帶赤白瀉痢淫熱積滯客於大腸祛痰逐冷消食醒酒

止痛安胎散咽喉口齒浮熱化銅鐵骨哽好古曰得檀香豆

智入脾得黃蘗伏苓入腎得赤石脂入大小腸白飛霞通

日辛能潤腎燥引諸藥歸宿丹田地黃用之并蒸亦取其下

達也經疏曰腎虛氣不歸元用辛竄性燥血虛火炎者勿

為向導殆勝桂附熱藥為害

辛竄性燥血虛火炎者勿

砂仁 白芷 草豆蔻

用胎婦多服耗氣必致難產 出嶺南炒去衣研百一選方治魚骨入

咽砂仁甘草等分爲末經包含之燕汁當隨痰出

曰荳蔻宜行氣暖胃

辛熱流行三焦溫暖脾胃三焦利脾胃運諸證自平而爲肺家本藥肺主

散滯氣消酒積除寒燥溼化食寬膨治脾虛瘧疾感寒腹痛

吐逆反胃自睛翳膜白睛屬肺能散肺滯太陽經曰背紅筋太陽脈起目眥

火升作嘔因熱腹痛氣虛諸證咸宜禁之 番舶者良去衣

微焙研細胃冷惡心食即欲吐白荳蔻三枚搗細好酒服

荳蔻陶產名草蔻。燥溼祛寒

辛溫香散暖胃健脾燥溼祛寒治寒客胃痛霍亂瀉痢噎膈

反胃痞滿吐酸解口臭酒毒魚肉毒

故食料用之

辛燥犯血忌

陰不足者遠之 形如龍眼而微長皮黃白薄而稜峭仁如

砂仁辛香氣和去膜微炒香同約辛末含去口臭

草果

滇廣所產名草也。除痰截瘧

辛熱破氣除痰消食化積

瘧積

治瘴癘寒瘧

佐常山能截瘧或與知母同用取其

一陰一陽治寒熱瘴癘蓋草果治太陰獨勝之寒知母治陽明獨勝之火

若瘧不由於嵐瘴氣

不實邪不盛者竝忌

形如訶子皮黑厚而稜密子粗而辛

臭麝裏煨熟取仁用忌鐵

肉荳蔻

一名肉果。溫中瀉腸

辛溫氣香理脾暖胃下氣調中

日華稱其下氣以脾得補而善運氣自下也非若陳皮香

附之逐冷除痰消食解酒辟鬼殺蟲治積冷心腹脹痛中惡

吐沫小兒吐逆乳食不下又能瀉大腸止虛瀉冷痢 病人

有火瀉痢初起皆不宜服 出嶺南似草薺外有縐紋內有

斑紋糯米粉裹或麪裹煨熟須去油淨忌鐵陰寒滑痢腹痛

和麪裹煨爲末
粥飲調服一錢

破故紙 一名補骨脂。燥補命火

辛苦大溫入心包命門補相火以通君火暖丹田壯元陽縮

小便 亦治遺溺治虛寒喘嗽 能納氣歸腎腰膝痠痛腎冷精流火虛泄

瀉 命門火衰不能蒸蒸脾胃脾胃虛寒遲於運化致飲食減

兩吳萸一兩命門相火以生土破故紙四兩五味三兩肉蓯二婦人血氣

婦人之血脫氣陷亦墮胎 陰虛有熱大便閉結者戒之
猶男子之腎冷精流

出南番者色赤嶺南者色綠酒浸蒸用亦有童便乳浸鹽水

炒者得胡桃胡麻良惡甘草 唐郊相國方破故紙十兩酒浸
蒸為末胡桃肉二十兩去皮爛

研蜜調如飴每晨酒服一大匙治虛寒喘嗽腰脚痠痛忌羊
血蕪薑加杜仲名青娥丸白飛霞曰故紙屬火堅固元陽胡

桃屬木潤燥養血有
木火相生之妙也

益智子 燥脾胃補心氣命門

辛熱本脾藥兼入心腎主君相二火補心氣命門之不足能

滴精固氣又能開發鬱結使氣宣通溫中進食攝唾涎 胃冷
則涎

湧 縮小便 胃與膀胱相表裏益智辛溫固腎鹽水炒同治客
鳥藥等分酒煮山藥糊丸鹽湯下名縮泉丸

寒犯胃冷氣腹痛嘔吐泄瀉泄精崩帶 血燥有熱因熱而

崩帶遺濁者不可誤入也 出嶺南形如棗核取仁鹽水炒

腹脹忽瀉不止諸藥不效濃煎益智飲之

蛇牀子

補腎命去風溼

辛苦而溫強陽補腎散寒祛風燥溼殺蟲治陰痿囊溼女子

陰痛陰癢

徑生蟲同 琴煎湯洗

子藏虛寒產門不開

炒熱 與之

腎命之病腰

痠體痺帶下脫肛及頑癬惡瘡

多效 療之

風溼諸病煎湯浴止風

癢

時珍曰腎命三焦氣分之藥不獨補助男子而且有益婦人世人舍此而求補藥於遠域豈非貴耳賤目乎

腎火易動者勿食

似小茴而細微炒殺毒則不辣

以地黃汁拌蒸

三遍

惡丹皮貝母巴豆

聖惠方冬月喉痺腫痛不可下藥者蛇牀燒煙於瓶中日含瓶口吸煙其

痰自

出

畢菱

一作撥。燥除胃冷散浮熱。

辛熱除胃冷祛痰消食下氣治水瀉氣痢虛冷腸鳴亦入大腸經

嘔吐酸水冷痰惡心症癰陰疝辛散陽明之浮熱治頭痛偏

風者口含溫水隨左右以末吹一字入鼻效牙痛寒用宜乾蘼畢菱細辛熱痛宜石骨牙痛風痛宜皂角蠟蠶蜂

房二烏蟲痛宜石灰雄黃鼻淵古方用此甚少以其耗散真氣動脾肺

之火且損目耳出南番嶺南亦有類樁子而長青色去挺

醋浸一宿焙乾刮去皮粟子淨炙傷人肺衛生易簡方鼻流涕用畢菱末吹

之效

良蘼

宜燥暖胃散寒

辛熱暖胃散寒消食醒酒治胃脘冷痛凡心口一點痛俗言心痛非也乃胃脘有

本草從新

畢菱

良蘼

卷白

主

草部

滯或有蟲及因怒因寒而起以良薑酒洗七次香附磨洗七次焙研因寒者用二錢附一錢因怒者附二錢薑一錢寒怒兼者每一錢五分米飲加薑汁一匙隨少許服○古方治心脾疼多用良薑寒者用之至二三錢熱者亦用四五分於清火劑中取其辛溫下氣止痛有神耳 嵐瘴瘧疾霍亂瀉痢吐惡噎膈冷癖 虛

人須與參朮同行若單用多用犯沖和之氣矣 出嶺南高

州東壁土拌炒用

紅蓮莖

即良薑子宜燥溫肺醒脾

溫肺散寒醒脾燥溼消

食解酒禁忌製用同上

藿香

宜去惡氣

辛甘微溫入手足太陰

肺

快氣和中開胃止嘔去惡氣進飲

食治霍亂吐瀉心腹絞痛上中二焦邪滯

稟清和芳烈之氣為脾肺達氣要藥

局方有藿香正氣散正氣通暢則邪逆自除

陰虛火旺及胃熱胃虛作嘔者戒

用 出交廣方莖有節葉微似茄葉古唯用葉今枝梗亦用

一因葉多偽也

冷露瘡爛藿香葉細茶等分燒灰油調塗之良

白芷

宣發表祛風燥溼

色白味辛行手陽明庚金

大腸

性溫氣厚行足陽明戊土

香上達入手太陰辛金

肺

故王治不離三經通竅發汗除溼

散風治頭目昏痛

陽明之脈榮於面故治頭面諸疾楊吉老方白芷湯泡四五遍蜜丸彈子大名都梁

丸每服一九荆芥點腦茶嚼下

眉稜骨痛

風熱與痰同酒浸黃芩為末茶下

牙痛

上齲屬足陽明下齲

屬手陽明二經風熱

鼻淵

肺主鼻風熱乘肺上燥於腦故鼻多濁涕而淵經曰腦滲為涕宜同細辛辛夷治之

瘡淚出面

肝子去聲面黑氣

癰疵

可作面脂

皮膚燥癢三經風熱之病及

血崩血閉腸風痔瘻癰疽瘡瘍三經溼熱之病活血排膿有

敗膿血淋露腥穢致臍生肌止痛解確毒蛇傷先以繩札傷處酒調下白

芷末五錢種又治產後傷風諸種頭痛白魚尾上攻血虛頭

口正能辟蛇加辛芷氣虛頭痛多在清晨宜芎藭倍參芪劉松石保壽金

經驗方治偏正頭風白芷川芎各三錢搽牛腦上加酒頓熱

熱食盡醉其病如失燥能耗血散能損氣有虛火者勿用癰疽已潰

宜漸減去色白氣香者佳名官不香者名水白芷不堪用

微焙當歸為使惡旋覆花

藥本宜去風寒溼辛溫雄壯為太陽經風藥勝寒鬱本經頭痛連腦者必用之

凡巔頂痛宜藥本治督脈為病脊強而厥督脈起太陽經貫脊又能下

防風酒炒升柴

行去溼治婦人疲瘦陰寒腫痛腹中急痛皆太陽經寒溼胃風泄瀉

夏英公病泄醫以虛治不效霍翁曰此風客於胃也飲以藁本湯而愈蓋藁本能除風溼耳粉刺酒醱和

並作面脂良按頭痛挾內熱及傷寒發於春夏陽證頭痛不宜

進也根紫色似芎藭而輕虛氣香味麻惡藺茹小兒疥癬藥本煎湯

浴並洗衣

香薷宜通利溼消暑又熱

辛散皮膚之蒸熱溫解心腹之凝結屬金水而主肺為清暑

之主藥肺氣清則小便行而熱降暑必兼溼治暑必兼利溼若無溼但為乾熱非暑也

治嘔逆水腫熬膏服小腳氣口氣煎湯含漱單服治霍亂轉筋

香薷乃夏月解表之品無表邪者戒之其性溫熱陰暑宜用以溫散若陽暑則宜

清涼誤服之反成大害時珍曰有處高堂大厦納涼太過飲
冷太多陽氣為陰邪所遏反中入內遂病頭痛惡寒煩躁口
渴吐瀉霍亂宜用之以發越陽氣散邪和脾則愈若飲食不
節勞役作喪之入傷暑汗出如雨煩躁喘促或瀉或吐者乃
內傷之證宜用清暑益氣湯人參白虎湯之類以瀉火益元
若用香薷是重虛其表而益之熱矣○今人謂能解暑概用
代茶是開
門揖盜也 陳者夏宜冷服經所謂治溫以清涼而行之也
陶水一盞煎汁二分入豬脂半
兩和塗白禿慘痛加胡粉和塗

荊芥 一名假蘇○輕宜發表祛風理血

辛苦而溫芳香而散入肝經氣分兼行血分其性升浮能發

汗散風溼利咽喉清頭目治傷寒頭痛中風口噤身強項直

口面喎斜目中黑花其氣溫散能助脾消食氣香入脾通利血脈

治吐衄腸風崩中血痢產風血運產後去血過多腹內空虛則自生風故常有崩運之

歸和血散血同桔梗枳殼利膈寬腸同荀子杏仁

氣虛表

消痰定喘

同木瓜厚朴散溼解暑治霍亂腳氣

氣香者

虛者禁之

俗喜其芳香且暮資食不知泄真元之氣古稱芳草致豪貴之疾此類是也

良宜橘皮忌鯉魚

蘇子

潤降氣消痰

開鬱降氣

力倍消痰利膈溫中寬腸潤

心脾止喘欬

腸滑氣虛者禁之

炒研

蘇梗

宣順氣

順氣安胎功力稍緩挾虛者宜之

雞蘇

一名水蘇一名龍腦薄荷。輕散熱理血

辛而微溫清肺下氣理血辟惡消穀治頭風目眩肺痿血痢

吐衄崩淋喉腥口臭邪熱諸病

辛烈之物走散真氣虛者

宜慎

方莖中虛似此葉而微長密齒面皺

薄荷 輕宣散風熱

辛能散涼能清本經溫蓋體升浮能發汁搜肝氣而抑肺

疏逆和中宣滯解鬱消散風熱清利頭目治頭痛頭風中風

失音痰嗽口氣語澇舌胎含漱或和眼耳咽喉口齒諸病辛香

散風熱通竅而皮膚癰癤瘡疥驚風小兒治驚藥有骨蒸消宿食止

血痢血痢病在凝滯通關節定霍亂貓鼠蛇傷薄荷貓之酒也犬虎之酒

也輕蛇雞之酒也桑甚鳩之酒也茅草魚辛香伐氣多服

損肺傷心虛者遠之每見小兒多食薄荷糕者汗多體弱蘇州所時者莖小

而氣芳最佳江西者稍粗次之四川者更粗又次之野生者

莖葉氣味都相似入藥以蘇產者為勝張果醫說方灸大毒氣入內兩股生瘡汁

薄荷 甘松香 山 草 郎

水淋漓者用薄荷煎汁頻塗立愈

甘松香 宜理氣醒脾

辛甘溫芳香理諸氣開脾鬱時珍曰少加入脾胃藥中甚醒脾氣治風疔齒齩

肺氣膝浮煎湯淋洗卒然心腹痛滿下氣味雖帶甘畢竟辛香

伐氣挾虛者忌之出松州涼州遼州等處葉細如茅草用

根根極繁密八月采之作湯浴令人身香

山柰 俗作三柰○宜溫中辟惡

辛溫暖中辟瘴癘惡氣治心腹冷痛寒溼霍亂風蟲牙疼

辛香伐氣甚於甘松香不宜輕服產拂林國今廣中亦栽

之根葉皆如生薑與甘松良薑俱入台諸香用

爛酣草

宜溫中辟惡

辛溫芳香暖中辟惡去臭氣止霍亂吐瀉 忌同上 尖葉
大如指甲有枝梗夏月開細紫花成簇結子亦細今人俱益
內種之婦女摘其頭以插髮

茉莉花

辛熱主治蒸油取液作面脂頭澤長髮潤燥香肌亦入茗湯
以其無毒也

根 辛熱有毒主治以酒磨一寸服則昏迷一日乃醒二寸
二日三寸三日凡跌損骨節脫臼接骨者用此則不知痛也
茉莉原出波斯移植南海今中華俱栽蒔之臺灣所栽者

最佳福州者次之贛州者又次之

本草從新卷三目錄

草部 陸草六十五種

生地黃 乾地黃 熟地黃 鱧腸 麥門冬 甘菊花

穀精草 草決明 決明子 木賊草 麻黃 刺蒺藜

沙苑蒺藜 茺蔚 夏枯草 青蒿 連翹

紫花地丁 漏蘆 惡實 大小薊 馬鞭草

劉寄奴 紅花 王不留行 瞿麥 篇蓄

車前子 鐘心 地膚子 冬葵子 海金沙 茵陳

葶藶子 大青 青黛 蘆根 豨薟草 旋覆花

紫苑 款冬花 牛膝 續斷 胡盧巴 艾葉

木繇

雞冠花

元寶草

雪裏青

萬年青

白米飯草

淡竹葉

蒼實

筴

芭蕉根

芋麻根

萱草

石龍芮

狗尾草

敗醬

薇銜

蠡實

石龍芻

酸漿

鼠麴草

本草從新卷三

草部 眼草類

生地黃 大瀉火平血逆

味苦微甘大寒入心者瀉丙火

小腸為丙火心與小腸相為表裏 清燥金胃

腸平諸血逆消瘀通經治吐衄崩中

唾血者血隨唾出咯血者隨痰咯出或帶血絲

出腎經及肺經自兩脇逆上吐出者屬肝經吐出嘔出成盆成碗者屬胃經欬血者欬出痰內有血衄血者血溢於腦從鼻而出並屬肺經經漏不止曰 熱毒痢疾腸胃如焚傷寒瘟

疫痘證

血熱紫 諸大熱大渴引飲折跌絕筋 生地一斤瓜蘖精一斤生薑四兩炒

熱毒傷折處冷則易之又生地汁 三升酒升半煮服下撲損瘀血

利大小便又能殺蟲治心

腹急痛

海上方搗汁和麴作餅 飢食能利出蟲忌用鹽

必燥結有實火者方可用

生掘鮮者搗汁飲之熱喝昏沈地黃汁一盞服之

乾地黃

養陰涼血

苦甘而寒沉陰而降入手足少陰心厥陰肝心包及手太陽經

小養陰退陽涼血生血治血虛發熱常覺飢餓五心煩熱

陰虛生痿痺驚悸有觸而心動曰驚無驚而自動曰悸即怔

內熱有因水停心下者火畏水故悸也地黃能倦怠嗜臥肝火鬱

交心腎而益肝膽亦能行水故治之也痛為血淋不血

同歸身用胸膈痞悶肝膽燥火閉伏胃吐衄尿血痛為尿血

通崩中經曰陰虛陽搏謂之崩調經安胎利大小便性寒而潤脾虛

泄瀉胃虛食少均在禁例以懷慶肥大而短糯體細皮菊

花心者佳用沉水者浮者不用惡貝母畏蕪荑忌萊菔慈蒜

洞藏器得門冬丹皮當歸良

熟地黃

平補肝腎養血滋陰

甘而微溫入足三陰經滋腎水封填骨髓利血脈補益真陰

聰耳明目

耳為腎竅目為肝竅目得血而能視耳得血而能聽

黑髮烏鬚又能補脾陰

止久瀉

經云腎司二便久瀉多屬腎虛且下多亡陰自宜補腎不可專責脾也

治勞傷風痹陰

虧發熱乾欬痰嗽

欬嗽陰虧者地黃丸為要藥亦能除痰丹溪曰久病陰火上升津液生痰不生血宜

補血以制相火其痰自除喻嘉言曰凡欬嗽漸至氣高汗漬下補其下但清其上必至氣脫卒亡醫之罪也

氣短

喘促

熟地一兩歸身三錢炙甘草一錢名貞元飲治氣短似喘促喘呼吸急促促不能升燕不能降氣道壅塞勢極垂危

者常人但知氣急其病在上而不知元海無根肝腎虧損此子午不交氣脫證也尤惟婦人血海常虧者最多此證宜以

此飲濟之緩之僅庸眾不知妄云痰逆氣滯用

胃中空虛覺

牛黃蘇合及青陳枳殼破氣等劑則速其危

餒痘證血虛無膿病後脛股痠痛產後臍腹急疼

丹溪曰產前當清熱

養血為主產後宜大補氣血雖有雜證從末治之

感證陰虧無汗便閉

陰氣外溢則得汗陰血下

潤則諸種動血一切肝腎陰虧虛損百病為壯水之主藥

按熟地黃性滯痰多氣鬱之人能窒礙胸膈用宜斟酌

郭佩蘭本

草匯曰丹溪云氣病補血雖不中病亦無害也不知血藥屬陰其性凝滯胃虛氣弱之人過服歸地等劑必致痞悶食減病安能愈耶景岳全書曰地黃產於中州沃土之鄉得土氣之最厚者也其色黃土之色也其味甘土之味也而謂非脾胃中州之藥吾不信也但脾胃喜溫而惡寒生乾地黃性寒自非脾胃所喜蒸曬極熱則甘溫正與脾胃相宜耳殊不知熟地黃乃陰滯不行之藥作熟地黃法揀取肥地黃沈水大為脾胃之病所不宜也

者數十斤洗去沙土略曬乾別以揀下瘦小者數十斤擣絞

取汁投石器中浸漉令流入柳木甌放瓦鍋上蒸一日曬幾

曰令極乾又蒸又曬如是九次鍋內僅有淋下地黃餘汁亦必拌曬使汁盡而乾其地黃光黑如棗味甘如飴須瓷器收之以其脂柔喜潤也按地黃取其純陰靜重近時多拌以好酒及砂仁末而蒸曬之是反以散動香燥亂其性矣其法甚為不善有用薑汁拌炒者尤不合法○今市中惟以一煮而售害有不可勝言者蓋稟北方純陰至寒之性非太陽與烈火頻煩一鍊則不溫所以固本膏雖經日煎熬必生熟各半而用之設以生地一煮便作熟地投用歸腎右歸七味八味等劑中則寒涼之性未除心腎之經各別以心經寒涼之藥為君主以腎經溫暖之藥為臣佐豈徒無益反引寒性下損真陽微虛者暫堪抵受大虛挾寒者氣立孤危製治乖方而為害甚烈斯其最也○市醫嘗將熟地枸杞等炒作炭用是甘潤養陰之品變而為苦燥傷陰之物非徒無益而又害之矣

鱧腸

即旱蓮草又名金陵草○補腎

甘酸而寒汁黑補腎黑髮烏鬚赤痢變糞止血

鍼灸瘡血不止者敷之亦

本草

鱧腸

麥門冬

三

草

部

妙因齒擦功善益血涼血當及時多收其效甚速純陰之質不益脾

胃若不同蘆汁椒紅相兼修服者恐腹痛作瀉苗如旋覆

實似蓮房斷之有汁須臾而黑熬膏良偏正頭風用汁滴鼻中良

麥門冬潤肺清心瀉熱

味甘微苦微寒潤肺清心瀉熱除煩微寒能化痰行水肺清

道下行故生津止嗽午前嗽多屬胃火午後嗽及日輕夜重者多屬陰虛宜麥冬五味同滋陰藥用

治嘔吐胃火上衝則嘔宜麥冬又有痰壅手足緩縱曰痰壅陽明經熱上蒸於

肺肺熱葉焦發為痰壅經疏客熱虛勞暑傷元氣脈絕短氣

日麥冬實足陽明之正藥同人參五味名生脈散蓋心主脈肺朝百脈補肺清心則氣

充而脈復故脈絕將死者服此能復生之夏月火旺冠金服之尤宜東垣曰人參甘溫益元氣而瀉虛熱下冬苦寒滋燥

金而清水源五味酸溫瀉丙火而補庚金益五臟之氣也○

丙火小腸庚金肺痿吐膿血熱妄行經枯乳閉明目悅顏之

大腸竝主津液性寒而潤虛寒止瀉者勿用肥白而大者佳去心入滋補

藥酒潤制其或拌米炒黃地黃車前為使惡款冬苦參青箱

木耳忌鯽魚熬膏良齒難出血煎湯漱之

甘菊花宜祛風熱補肺腎明目

甘苦微寒備受四氣冬苗春葉飽經霜露得金水之精能益

肺腎二臟以制心火而平肝木木平則風息火降則熱除故

能養目血去翳膜與枸杞相對蜜丸治白淚頭眩散溼痺

風家園所種杭產者良花小味苦者名苦蕒非真菊也景

人有黃白二種單瓣味甘者入藥點茶釀酒作枕俱佳曰車

枸杞子地骨皮爲使

鞠青葉救垂危疔毒

以葉搗爛入酒絞汁飲之其渣

敷於毒上神效

穀精草

輕明目

辛溫輕浮功善明目退翳兼治頭風喉痹牙疼疥癩

田中

收穀後多有之田低而穀爲水腐得穀之餘氣結成

穀精草爲未熟

穀湯服二錢治鼻衄不止

草決明

一名青箱子。瀉肝明目

味苦微寒除風熱治一切目疾蟲疥惡瘡

龍動陽火瞳子

散大者勿服

類雞冠而穗尖長

決明子

瀉肝明目

甘苦鹹平祛風熱

作枕能治頭風

治青盲內障翳膜遮睛赤腫眶爛

淚出羞明

狀如馬蹏以能明目故名擣碎煎

葉作羹食

利五臟明目

木賊草

輕發汗退目翳

甘苦而平治目疾迎風流淚翳膜遮睛

翳乃肝邪鬱遏不能上通於目

去節

者能發汗中空而輕有升散火鬱風溼之功

多服損肝

舌梗

出血木賊煎水漱之即止

水漱之即止

麻黃

輕發汗

辛苦而溫

僧繼洪云中牟產麻黃地冬不積雪性熱可知

入足太陽

膀胱

兼走手少陰

陽明

心大

而為肺家專藥能發汗解表去營中寒邪疏通氣

血利九竅開毛孔治傷寒頭痛惡寒無汗

東垣曰十劑云輕可去實葛根麻黃

之類是也邪客皮毛腠理閉拒營衛不行故謂之實二藥輕清可去之時珍曰麻黃太陽經藥兼入肺經肺主皮毛葛根陽明經藥兼入脾經脾主肌肉二藥皆輕揚升發而所入不同好古曰麻黃湯治衛實桂枝湯治衛虛雖皆太陽經藥其實營衛藥也心主營爲血肺主衛爲氣故麻黃爲手太陰肺之劑桂枝爲手少陰心之劑時珍曰仲景治傷寒無汗用麻黃有汗用桂枝未有究其精微者津液爲汗汗卽血也在營則爲血在衛則爲汗寒傷營營血內滯不能外通於衛衛氣固閉津液不行故無汗發熱而惡寒風傷衛衛氣外泄不能內護於營營氣虛弱津液不固故有汗發熱而惡風然風寒皆由皮毛而入其毛孔之合也蓋皮毛外閉則邪熱內攻故用麻黃甘草同用以液引出營分之邪達之肌表佐以杏仁泄肺而和氣汗後無大熱而喘者加石膏活人書夏至後加石膏知母皆泄肺火之藥是麻黃湯雖太陽陽發汗重劑實散肺金火鬱之藥腠理不密則津液外泄而肺氣虛虛則補其母故用桂枝同甘草外散風邪以救表內伐肝木以防脾佐以芍藥泄木而固脾使以適棗行脾之津液而和營衛下後微喘者加厚朴杏仁以利肺氣也汗後脈沈遲者加人參以益

肺氣也有火者加黃芩為陽旦湯以瀉肺實也是桂枝湯雖太陽解肌輕劑實為理脾救肺之藥也溫瘧欬逆

上氣風寒鬱於肺經經曰痰哮喘哮喘證宜瀉肺然惟皮肉

不仁水腫風腫 嗟冬月在表真有寒邪者宜之若非冬月

或無寒邪或寒邪在裏或傷風等證雖發熱惡寒不頭疼身

疼而拘急六脈不浮緊者皆不可用雖可汗之證亦不宜過

劑汗為心液過汗則心血為之動或亡陽或血溢發汗用

莖去節煮十餘沸掠去浮沫或用醋湯略泡曬乾亦有用蜜

水炒者庶免止汗用根節隨時出汗為自汗屬陽虛夢中出

粟米等分為末袋成撲之佳時珍曰麻黃發汗汗為盜汗屬陰虛用麻黃根蛤粉

節止汗效如影響物理不可測如此白汗有風淫傷風風濕

氣虛血虛胃熱痰飲中暑亡陽柔痙等證皆可加用蓋性能

臟亦各有汗經曰飲食飽甚汗出於胃驚而奪精汗出於心持重遠行汗出於腎疾走恐懼汗出於肝搖體勞苦汗出於脾

厚朴白微為使惡辛夷石膏

內外障翳麻黃根一兩歸身一錢同炒黑色入麝香一釐

為末噴鼻頻用效

刺蒺藜

疏肝瀉肺

辛苦而溫散肝風而瀉肺氣勝溼破血催生墮胎通乳閉消

癥瘕細審其質性不過瀉氣破血之品古方俱用以補腎

何也

產同州府去刺酒拌蒸

牙齒動搖出血不止白蒺藜末日擦之佳

沙苑蒺藜

補腎固精

苦溫補腎強陰益精明目治虛勞腰痛遺精帶下痔漏陰癰

性能固精若陽道數舉精難出者勿服

出潼關狀如

腎子帶綠色

今肆中所賣俱是花
草子真者絕無炒用亦可代茶

堯蔚即益母草○通行瘀血生新血

味辛微苦微寒入手足厥陰

肝心包

消水行血去瘀生新調經

解毒

瘀血去則經調

治血風血運血痛血淋胎漏產難崩中帶下

帶脈

橫於益間病生於此故名爲帶赤屬血白屬氣氣虛者補中益氣而兼升提血虛者養血滋陰而兼調氣

消疔腫

乳癰亦取其散

通二便

其性辛散滑利全無補益勿以其

有益母之名而濫用之神散大者尤忌

勒乳成癰益母草爲末水調塗乳上

一宿目消生精亦得

芫蔚子

調經明目

血滯病目者則宜之

活血順氣逐風

血和則氣行血活則風散

治心煩頭痛

血熱所致

胎產崩帶令人有子

凡婦人血滯血熱者服之有子特珍曰益

母根莖花葉實皆可同用苦治瘡腫胎產消水行血則宜並用若治血分風熱門已調經用子為良蓋根莖花葉專於行子則行中有補也 雖曰行中有補終是滑利之品非血滯血熱者有補也

勿與瞳神散大均在忌例 微炒忌鉞

夏枯草 散結消癰明目

辛苦微寒緩肝火解內熱散結氣治瘰癧鼠瘻癰瘤癰瘰堅乳

癰乳巖目珠夜痛 夜痛及點苦寒藥反甚者火為陰寒 人所鬱故兩夏枯能散厥陰之鬱火 人

用亦傷胃家

青蒿 瀉熱理勞清暑

苦寒得春木少陽之令最早 二月 故入少陽厥陰血分 肝治

勞瘦骨蒸 能除骨髓之熱用 薺勞虛熱久瘡久痢虛煩盜汗

水付搗取汁熬膏

能除陰風毒熱黃瘡疥惡瘡鬼氣尸疰身中鬼氣接引外邪

分伏熱將每發刺痛變動不常者為飛尸附骨入肉攻擊血脈見尸

聞哭便作者為遁尸淫躍四末不知痛之所在每發恍惚得

風雪便作者為風尸纏結臟腑冲引心脇每發絞切遇寒冷

便作者為沈尸舉身沈重精神錯雜嘗覺昏廢每節氣大發

者為尸疰時珍日月令通纂言伏內庚日采青蒿懸門庭可

辟邪冬至元旦各服二錢亦良則青蒿之治鬼疰蓋亦有所

伏也明目清暑辟穢凡苦寒藥多與胃家不利惟青蒿芬芳

襲脾宜於血虛有熱之人以其不犯冲和之氣爾寒而洩瀉

者仍當避之使子勿使葉使根勿使莖熬膏良聖濟總錄治鼻中息

肉青蒿灰石灰等

分淋汁熬膏點之

翹輕宣散結瀉火

味苦微寒而性升浮其形似心實似蓮房有瓣故入手少陰厥陰心

本直全片

連翹 紫花地丁 漏蘆 草部

包而瀉火兼除手足少陽三焦手陽明經大溼熱散諸經血

凝氣聚利水通經殺蟲止痛消腫排膿皆結者散之凡腫而痛者為實邪腫而不

痛為虛邪腫而赤者為結熱腫而不赤為留氣停痰為十二經瘡家聖藥經曰諸瘡痛瘻皆屬心火

苦寒之物多餌即減食癰疽潰後勿服集驗方治痔瘡腫痛連翹煎湯薰洗

後以刀上飛過緣礬入麝香貼之

紫花地丁瀉熱解毒

辛苦而寒治癰疽發背疔瘡癰癰無名腫毒 葉似柳而細

夏開紫花結角生平地者起莖生溝壑者起蔓乾坤秘藥治稻芒粘咽不

得出地丁草嚼燕下

漏蘆瀉熱解毒

苦下泄鹹輒堅寒勝熱入胃大腸通肺小腸散熱解毒通經
下乳排膿止血生肌殺蟲治遺精尿血癰疽發背古方以漏盧湯爲首
稱出閩中莖如油麻枯黑如棗者真甘草拌蒸連麴爲使
惡實一名牛蒡子一名鼠黏子。瀉熱解毒

辛苦而寒瀉熱散結除風宣肺氣清咽喉理痰嗽治痘證消
斑疹利二便行十二經散諸腫瘡瘍之毒利腰膝凝滯之氣
性冷而滑惟血熱便閉者宜之否則禁用痘證虛寒泄瀉

者切勿妄投 實如葡萄而褐色酒拌蒸待有霜拭去用

根苦寒竹刀刮淨絞汁蜜和服治中風汗出乃愈疔和豬脂

貼瘡腫及反花瘡

肉反出如花狀。小兒咽腫牛蒡根搗汁細嚥之

大小薊瀉涼血破血

甘苦涼皆能破血退熱治吐衄腸癰小薊力微能破瘀生新

不能如大薊之消癰毒

丹溪曰小薊治下焦之結熱血淋本

大薊汁

兩薊相似花如髻大薊莖高而葉皺小薊莖低而

葉不皺皆用根

舌輒出血不止或九竅出血鮮

馬鞭

瀉破血消脹殺蟲

味苦微寒破血通經殺蟲消脹治氣血癥瘕下部蠱瘡陰腫

持

發背癰疽楊梅毒氣

顓以驅逐爲長瘡證久而虛者斟

酌用之

下地甚多春月生苗方莖葉似益母對生夏秋開

細紫花作穗如車前穗其子如蓬蒿子而細根白而小用苗

葉集驗方男子陰腫大如升核痛人所不能治馬鞭草搗塗之

劉寄奴瀉破血止血

苦溫破血通經除癥下脹止金瘡血多服令人吐利一

莖直上葉尖長糙澀花白蕊黃如小菊花有白絮如苦蕒絮

子細長亦似苦蕒子莖葉花子皆可用風入瘡口腫痛劉寄奴為末慘之即止

紅花古名紅藍花。通行血潤燥

辛苦甘溫入肝經而破瘀血活血瘀行則血活有熱結於中暴吐紫黑血者吐出為好

吐未盡加桃仁紅花行之潤燥消腫止痛凡血熱血瘀治經大抵鮮血宜止瘀血宜行

閉便難胎死腹中非活血行血不能下產後血運口噤有產婦血悶而死名醫陸氏以

紅花數十斤煮湯寢婦於上而薰之湯冷再加半日而蘇金匱有紅藍花酒治婦人六十二證風證喉痹不通

痘瘡血滯 過用能使血行不止而斃 酒噴微焙 臙脂

活血解毒敷痘疔 挑破以油 臙脂敷之 子功與花同 葉搗塗遊

腫

王不留行 通行血

甘苦而平其性行而不住 雖有王命不能走血分通血脈乃

陽明衝任之藥 陽明多氣多血 除風去痹止血定痛利便通經催生

下乳 氣盛血滯者可暫用以行之否則宜慎 治金瘡 止血 癰瘡疔瘡 散血 出竹木刺

失血後崩漏家及孕婦並忌之 花如鈴鐸實如燈籠子

殼五稜取苗子蒸漿水浸

瞿麥 通利水破血

苦寒降心火利小腸逐膀胱邪熱為治淋要藥若產後淋宜與蒲黃同用

五淋大抵皆屬溼熱熱淋宜八正及山梔滑石之類血淋宜

小蘗牛膝膏腎虛淋宜補腎不可獨瀉老人氣虛者宜參朮

兼木通山梔亦有痰滯中焦作淋者宜破血利竅決癰消腫

行痰兼通利藥不可發汗汗之必便血破血利竅決癰消腫

明目去翳通經墮胎性善下小腸虛者忌服恐心熱未除而

小腸復病矣當求其屬以衰之 花大如錢紅白斑爛色甚

嫵媚俗呼洛陽花用蕊殼丹皮為使惡慄蛸竹木入肉瞿麥為末水服方寸

七或煮汁日飲三次

蕭蓄一名扁竹口通淋殺蟲

苦平利小便治黃疸熱淋殺諸蟲治虻咬腹痛女子陰蝕煮服

疥瘡諸疾皆去溼熱之功葉細如竹弱莖蔓引促節有粉三月開

紅花

車前子

通利水清肺肝

甘寒清肺肝風熱滲膀胱溼熱開水竅以固精竅令人有子

男女陰中各有二竅一竅通精一竅通水二竅不並開水竅
開則溼熱外洩相火常寧精竅常閉久久精足明醫別錄云
服固精藥久服此行房即治溼痹五淋暑溼瀉痢目赤障翳
有子五子衍宗丸用之

催生下胎 陽氣下陷腎氣虛脫勿服入滋補藥酒蒸搗

餅入利水泄瀉藥炒研

車前草

通行水瀉熱涼血

甘寒涼血去熱通淋明目

凡利水之

劑多損目唯此能解肝與小
腸之溼熱熱去而目清矣

使葉勿使莖蕊

錢氏

輕通利水清心

甘淡微寒降心火清肺熱利小腸心與小腸相為表裏心火清則肺清小腸亦清而熱

從小便出矣通氣止血治五淋水腫燒灰吹喉痹塗乳止夜啼擦

解最良縛成把擦摩極癢時蟲從草出中寒小便不禁者

勿服破傷出血鎗心

地膚子通利水

甘苦而寒入膀胱除虛熱利小便而通淋時珍目無陰則陽無以作亦猶東垣

治小便不通用知藥滋腎之意王節齋云小便不禁或頻數

占方多以為寒而用溫澀之藥殊不知屬熱者多蓋膀胱火

邪妄動水不得寧故不能禁而頻數也老人多頻數由膀胱

血少陽火偏旺也治法當補膀胱陰血瀉火邪為主而佐以

收澀之劑如牡蠣山茱北味之類補血治癰疽散惡瘡煎湯

本草從新

燈花

地膚子

冬葵子

海金沙

三

三

三

蒿莖赤子類蠶砂惡螫蛎

脇下疼痛地膚子末酒服方寸匕

冬葵子

通潤腸利竅

甘寒淡滑潤燥利竅通營衛行津液利二便消水腫

用榆皮等分煎

通關格下乳滑胎

秋葵復種經冬至春作子者名冬葵子

根葉同功春葵子亦滑不堪入藥

蜀葵花赤者治赤帶白

者治白帶赤者治血燥白者治氣燥亦治血淋關格皆取其

寒潤滑利之功

湯火傷瘡冬葵葉爲末敷之

海金沙

通淋瀉淫熱

甘寒淡滲除小腸膀胱血分淫熱治腫滿五淋莖痛得梔子

牙消蓬砂治傷寒熱狂

大熱利小便此釜底抽薪之義

唯熱在太陽經血

分者宜之 產點中及河南收暴日中小乾以紙襯之以杖
擊之有細砂落紙上且暴且擊以盡為度莖細如線引竹木
上葉紋皺處有砂黃赤色忌火

茵陳 通利溼熱治諸黃

苦燥溼寒勝熱入足太陽經膀胱發汗利水以泄太陰陽明之

溼熱脾胃為治黃疸之君藥脾胃有溼熱則發黃黃者脾之色

多薰黃而色暗者溼多須五苓之類佐助成功又治傷寒時疾狂熱瘴瘧頭痛頭旋

女人痕癩皆溼熱為病按黃疸須分陰黃陽黃陽黃宜茵陳陰

黃宜溫補若用茵陳多致不救

葶藶子 大瀉氣閉通行水

辛苦大寒性急大能下氣行膀胱水肺中水氣膈急者非此不能除破積聚癥結伏留熱氣消腫除痰止嗽定喘

皆水淫汎溢

通經利便

十劑曰洩可去閉葶大黃之屬是也

性峻不

可混服有甜苦二種甜者力稍緩更宜大棗輔之

仲景有葶大棗湯

肺湯治肺氣喘急不得臥詡卷曰輔以大棗補土所以制水

子如黍米微長色黃糯米

微炒去米或酒拌炒榆皮爲使

頭風疼痛葶子爲末以湯淋汁沐頭三四度卽愈

大青

瀉心胃熱毒

苦鹹大寒解心胃熱毒治傷寒時疾熱狂陽毒發斑

熱甚傷血裏實

表虛則發斑紫黑者熱極而胃爛也多死活人書治赤斑煩痛有犀角大青湯黃疸熱痢丹毒喉痹

非心胃熱毒勿用

處處有之高二三尺莖圓葉長葉對

節生八月開小紅花成簇實大如椒色赤用莖葉

青黛 海肝散鬱火

鹹寒色青瀉肝散五臟鬱火解中下焦蓄蘊風熱衍義曰一婦患臍腹

二陰偏生溼瘡熱癢而痛出黃汁二便澀用鱗鱗松脂黃丹之類塗之熱痛愈甚其婦嗜酒喜食魚蝦發風之物乃用馬齒莧四兩研爛青黛一兩和塗熱痛皆去仍服八正散而愈此中下焦蓄蘊風熱毒氣若不出當病腸風內痔婦不能禁酒物果發痔治傷寒發斑血痢咯血台杏仁研置柿餅中煨小兒食名聖餅子治咯血

驚癇疳熱丹熱敷癰瘡蛇犬毒性涼中寒者勿使即陰虛

而有熱者亦不宜用真者從波斯國來不可得也今用乾

靛花取嬌碧者每斤淘取一兩亦佳內多石灰故須淘淨

蘆根 瀉熱止嘔

甘和胃寒降火治嘔噦反胃

胃熱火升則嘔逆食不下

客熱消渴傷寒煩

熱止小便數

肺爲水之上源脾氣散精上歸於肺始能通調水道下輸膀胱腎爲水臟而主二便三經有熱則小便數甚至不能少忍火性急速故也蘆中空清上焦溼熱解則肺之氣化行而小便復其常道矣

蘆笋能

解魚蟹河豚毒

反胃嘔吐由於寒者勿用

取逆水肥厚

者去鬚節

因熱霍亂煩悶蘆根三錢麥門冬二錢水煎服卽愈

豬莢草

宣去風溼

苦辛生寒熟溫治纏綿風氣四肢麻木筋骨冷痛腰膝無力

風溼瘡瘍

長於理風溼畢竟是燥血之品特之爲補非是

本草相傳功用甚奇近世服之經年罕效意者製法未盡善與風氣有分別與藥產非地道與亦以見執方者之失也

江蘇人呼豬爲豨其草似豬莢臭故名以五月五日六月

六日七月七日採者尤佳去粗莖留枝葉花實酒拌蒸曬九

次蜜丸

豬莖辛苦氣寒必蒸曬九次加以酒蜜則苦寒之陰濁盡去而清香之美味見矣數不至九陰濁未盡不

能透骨搜風而卻病也搗汁熬膏以生地甘草煎膏煉蜜三味收之酒

調尤妙

風氣行於腸胃泄瀉豬莖為末醋糊丸桐子大每服三十丸白湯下

旋覆花

名金沸草。瀉下氣消痰

苦辛能下氣行水鹹能軟堅微溫能通血脈入肺大腸經消

痰結堅痞唾如膠黍噫氣不除

噫於介切俗作愛胸中氣不暢故痰以通之屬不足亦有

挾痰挾火者屬有餘仲景治汗吐下後痞鞭噫氣者有代赭旋覆湯大腹水腫風氣溼痺走

散之藥冷利大腸虛人禁之根治風溼葉治疔瘡腫毒傳

金瘡止

類金錢菊去皮蒂蕊殼蒸用入煎劑須用絹包好

有細毛恐射
肺令人嗽

紫苑 潤肺下氣

辛溫潤肺苦溫下氣化痰止渴治寒熱結氣欬逆上氣欬吐

膿血 專治血痰為肺經虛熱小兒驚癇 亦虛而能開喉痹取

惡涎又能通利小腸 本草匯云苦能達下辛可益金故吐血

氣化及於州 辛散性滑暫用之品陰虛肺熱者不宜專用

多用須地黃麥冬共之 根作節紫色潤輒者良 今人多以

根偽 白者名女苑 時珍曰紫入血 去頭鬚蜜水浸焙款冬為

使惡天雄瞿麥藁本遠志畏茵陳 婦人小便卒不得出或

款冬花 潤肺化痰止咳

辛溫潤肺消痰除煩定驚明目治欬逆上氣喘渴肺虛喉痹挾火

肺痿肺癰欬吐膿血為治嗽要藥燒煙以筒吸之亦良本草

得腎之體先腎之用故為溫肺理嗽之最大抵欬必因寒寒

為冬氣入肺為逆欬冬非肺家順藥乃使肺邪從腎順流而

出也。欬冬百合等分蜜丸名百花膏治欬嗽痰血凡陰虛

勞嗽通用欬冬紫苑百合沙參生地麥冬五味苡仁如內熱

骨蒸加丹皮地骨若嗽而復瀉者為肺移熱於大腸十一

二月開花如黃鞠雪積冰堅欬花偏艷想見其純陽之稟故

任微見花未舒者良生河北關中世多揀淨花甘草水浸一

宿暴用得紫苑良杏仁為使惡阜角元參硝石畏辛夷青箱

麻黃連翹黃芪黃母雖畏黃母得之反良。口中疳瘡黃連

煎湯漱口乃以餅子敷之立消

牛膝 通下行補肝腎散惡血

苦酸而平足厥陰少陰經藥肝能引諸藥下行酒蒸甘酸而

溫益肝腎強筋骨肝主筋腎主骨治腰膝骨痛足痿筋攣陰痿血行

止下行故理足補肝久瘡以上皆補肝腎之功生用散惡血破癥結血行

則結則筋舒筋舒則陰強治心腹諸痛淋痛尿血熱蓄膀胱便瀉而痛曰淋氣淋

散寒戰後溲膏淋便出如膏石淋精結成石血淋澀痛尿血色

鮮者心與小腸實熱色紫者腎與膀胱虛冷和曰石淋乃

肝經移熱於胞中日久熬煎成石非腎與小腸病也大抵治

淋宜通氣清心平火利溼不宜用補恐溼熱得補增劇也牛

膝淋證要藥血淋尤宜用之杜牛膝亦可有中氣不足致
小便不利者宜補中益氣經所謂氣化則能出也忌用淋藥
之經閉產難下行之效喉痹齒痛引火癰腫惡瘡金瘡傷折
以上皆散出竹木刺擣爛罨之即出縱有升無降用以爲導
惡血之功

甚妙 主用皆在腎肝下部上焦藥中勿入夢遺滑精血崩

不止及氣虛下陷因而腿膝腫痛者大忌 出懷慶府長大

肥潤者良下行生用入滋補藥酒浸蒸惡龍甲畏白前忌牛

肉 口舌瘡爛牛膝浸酒含漱牙齒疼痛煎湯冷漱

續斷 補肝腎理筋骨

苦辛微溫補肝腎通血脈理筋骨主勞傷暖子宮縮小便止

遺洩破瘀血治腰痛胎漏懷妊崩帶腸風血痢平胃散一兩續斷二錢

半每服二錢米飲下治時痢甚效 癰痔腫毒又主金瘡折跌以功止痛生肌

女科外科需為上劑和而不滯行而川產良狀如雞腳皮

黃皺節節斷者真草芽根形似續斷去向裏鞭筋酒浸地黃

爲使惡雷丸

葉搗碎打撲傷損

胡盧巴

燥補腎命除寒溼

苦溫純陽入右腎命門暖丹田壯元陽治腎臟虛冷陽氣不

能歸元

同附子硫黃

痼疝冷氣

同茴香巴戟川烏川楝吳茱萸

寒溼脚氣

相火

熾盛陰血虧少者禁之

出嶺南番禺者良云是番菴菴子

淘淨酒浸暴或蒸或炒

小腸氣痛胡盧巴爲末每服二錢茴香湯下

艾葉

宜理氣血燥逐寒熱

苦辛生溫熟熱純陽之性能回垂絕之元陽通十二經走三

陰

太少

理氣血逐寒溼暖子宮止諸血溫中開鬱調經安胎

胎動腰痛下血膠艾湯

治吐衄崩帶

治帶要藥

腹痛冷痢血痢霍

亂轉筋殺虵治癰

醋煎服外科有用乾艾作湯投白礬二三錢洗瘡然後敷藥蓋人氣血冷必假艾力

以佐陽而艾性

又能殺蟲也

以之灸火能透諸經而除百病

丹田氣弱臍腹冷者以熱

艾裝袋兜臍腹甚妙寒淫

脚氣亦宜以此夾入襠內

純陽香燥凡血燥生熱者禁與

灸火亦大傷陰血虛者宜慎

陳久者良揉擣如絛謂之熟

艾灸火用婦人丸散醋煮擣餅再為末用

入茯苓數片同研則易細煎服

宜鮮者醋香附為使

艾附丸調婦人諸病宋時重湯陰艾日明成化來則以蘄州艾為勝云灸酒壘

一灸便透蒙筌發明竝以野艾為真蘄艾

雞香實非艾種今人多以蓬蒿偽蘄艾

木棉

綱目作木綿俗呼棉花

甘溫治血崩金瘡

白絛或布燒灰

子油辛熱微毒治惡瘡疥癬然

燈損目

有草木二種

草木出南番宋末始入江南今則徧及江北與中州矣不蠶而絛不麻而

布利被天下其益大哉
木本出交州永昌等處

雞冠花

甘涼治痔漏下血赤白下痢崩中赤白帶下

分赤白用

子治腸

風瀉血赤白痢崩中帶下

炒用

苗治瘡痔及血病

以花狀

命名

元寶草

補陰

辛寒補陰治吐血衄血

生江浙田塍間一莖直上葉對節

生如元寶同上或三四層或五六層

雪裏青

湯熱

苦大寒治咽喉急閉

搗汁灌之立效

一名過冬青生田塍間如天

名精而小葉布地生無枝梗四時不凋雪天開小白花

萬年青 湯熱

甘苦寒治咽喉急閉

搗汁入米醋少許灌之止痰立甦

一名千年薑子

可催生

白米飯草

一名糯米飯草。潤補肺

甘平潤燥補肺和中益胃治勞傷肺氣吐血欬嗽

不論根莖花葉搗汁

熬膏入上白蜜煉稠貯瓷器隨時服

又八

嗽草用花尤良

花味甚甘兒童常採以嗽其汁

故名

淡竹葉

通利水

甘淡寒利小便

小便利則心火因之而清故能兼除煩熱

有走無守孕婦禁服

本草從新

萬年青

白米飯草

淡竹葉

著實

著

九

草

部

春生苗高數寸細莖綠葉儼如竹秋結小長穗

根苗搗汁和米作酒

類甚芳烈

著實補中氣

味苦酸平益氣充肌明目聰慧先知久服不飢不老

此神草也故本

經列之上品

葉治痞疾

腹中痞塊著葉獨蒜穿山甲末食鹽同好醋搗成餅量痞大小貼之以兩炷香

為度其痞化為血從大便出

通肺氣

著

甘寒利肺氣

聖濟總錄治肺壅鼻衄著葉燒灰白麩各三錢研勻井花水調服二錢

治諸血證

並燒存性溫

通小便

百一選方治五淋血淋尤妙多年煮酒瓶頭著葉每用七箇燒存性入麝香一

盞陳米飲

療喉痹

集簡方治咽喉閉痛著葉燒灰等分吹之甚妙

消癰腫

趙宜真濟急則

方治吹奶乳癰五月五日樓
箬燒灰酒服二錢即散累效
愈目疾
經驗方籠箬燒灰
淋汁洗之自效

芭蕉根
瀉熱解毒

甘大寒治一切腫毒發背欲死赤遊風癰風熱頭痛
葛洪肘後方並

搗爛塗之
產後血脹
搗汁溫服
消渴飲水
骨節煩熱生瘡
天行熱

狂上
同血淋澀痛
聖惠方早蓮草
等分煎服日二
瘡口不合
直指方取
汁抹之

苧麻根
通治血淋

甘寒治小便不通
同蛤粉各半兩為末每服二錢○摘元方
苧根洗研攤絹上貼少腹連陰際須臾即

通痰哮喘嗽
正傳方煨存性為末生豆腐醃三五錢食
即效未全可以肥豬肉二三片醃食甚妙
肛門

腫痛
生瘡爛
脫肛不收
搗爛煎
療血淋
煎湯頻服亦治諸淋
藏器曰苧性破血將

產後腹痛以苧安腹上即止也

萱草

通去淫熱

甘涼煮食治小便赤澀去煩熱利溼熱除酒疸作菹利胸膈

安五藏令人歡樂忘憂輕身明目

根治沙淋下水氣

小便不通

煎水頻飲甚良
偏身水腫亦效

除酒疸

黃色偏身者搗汁服

吹乳乳癰腫痛

搗酒服外以萍封之

石龍芮

補陰潤燥

苦平補陰氣不足治失精莖冷令人皮膚光澤有子

時珍曰石龍芮

乃平補之藥古方多用之其功與枸
杞覆盆子相埒而世不知用何哉

逐諸風利關節止煩渴

明耳目

用子

根皮功用相
倣差不及爾

葉

名水莖俗呼胡椒菜

甘微辛苦瀉寒除心下煩熱主寒

熱鼠癭癰癰生瘡結核聚氣

食療本草薑菜日乾為末油下
煎成膏日三五度摩之便瘥

瘀血易簡方血疔初起止霍亂解諸毒唐本草搗汁洗馬毒

毒及癰腫○淮南萬畢術蛇咬生瘡生草汁塗之

狗尾草

疣目貫髮以莖穿之即乾滅凡赤眼拳毛倒睫者翻轉目瞼

以一二莖蘸水熨去惡血甚良 一名莠之亂苗即此又名光明

草治目疾故名

敗醬通破血解毒

苦平解毒排膿治癰腫破凝血療產後諸病時珍曰敗醬乃

藥也善排膿破血故仲景治癰及古方婦人科產後腰痛腹痛等證多用之後人不知用蓋未遇識者爾 一名

苦菜用根苗楊氏療乳方治蠅螻尿瘡遠

薇銜 通祛風解毒

苦平治風溼痹歷節痛薦癰賊風鼠瘻癰腫

素問用治酒風
證見身熱懈惰

汗出如浴惡風少氣以澤瀉丸各十分薇銜五分合以三指撮為飯飯

麋鹿一類也蘇恭曰南人謂之吳鹿草一名鹿銜草言鹿有疾銜此草即瘥也

蠶實 即馬薺子。燥治寒疝冷積

甘溫治小腹痛痼腹內冷積水痢諸病

石龍芻 即龍鬚草。通淋

苦微寒治小便淋閉莖中熱痛 敗席主治略同 取蒲敗

有垢者方尺煮汁服

煖漿 即燈籠草。通清淫熱

苦寒除熱利溼清肺化痰除煩滿通小便治黃病效治上氣欬嗽

並煮汁或研敷小兒閃癖丹溪曰燈籠草苦能除溼熱輕能

膏生癰汁服治上焦故主熱嗽咽痛此草治熱

痰欬嗽佛耳草治寒痰欬嗽也時珍曰酸漿除熱故能清肺

治蘇利溼故能化痰治癖一人病虛乏有痰欬嗽以此加入

湯中甚效根莖花葉俱可用葉貼灸瘡不發

子酸平與根莖花葉同功天泡溼瘡搗子敷之或為末油調

鼠鞠草即佛耳草。救荒

甘平除痰止嗽時珍曰別錄云治寒熱止欬嗽東垣云治寒

寒嗽多是火鬱於內而寒覆於外也按陳氏經驗方云一奇

散治一切欬嗽不論久遠晝夜無時用款冬花加倍佛耳草

減半熟地黃二兩焙研末每用二錢於爐中燒之以筒吸煙

嚥下有涎吐去子家一獲久病此醫治不效偶在沅州得一

婢用此法兩服而愈也雜米粉作糗食甜美荒年當糧最佳

鼠鞠草

鼠鞠草